

Docteur Benoît VOGT

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris
Ancien Chef de Clinique-Assistant des Hôpitaux de Paris
Ancien Chirurgien des Hôpitaux de Paris

Chirurgien Urologue

N° 41 1 01933 4

Polyclinique de Blois

1, rue Robert Debré
41260 LA CHAUSSEE SAINT-VICTOR
Secrétariat : 02 54 90 65 60

Vous venez d'être opéré au niveau de la verge

Plastie de prépuce

Je vous ai opéré au niveau de la verge et une plastie de prépuce a été réalisée.
Le gonflement est normal et partira en quelques jours.

S'il n'est pas possible de décalotter le soir même, ce n'est pas grave. Essayez de décalotter sous la douche le soir suivant ou dès que le gonflement est parti.

Plastie de prépuce ou de frein

Les douches sont conseillées. Les bains sont possibles.

- S'il existe un saignement, il suffit d'appuyer dessus avec ses doigts 3 minutes.
- Si un fil part, il suffit de tamponner avec du Dakin et de laisser sécher.
- Si l'aspect paraît rouge ou gonflé plusieurs jours après, il peut y avoir une inflammation. Il n'y a pas nécessairement une infection. Les soins locaux au Dakin et le temps guériront la plaie.
- S'il existe des croûtes, il faut les ramolir au Dakin. La verge peut alors être immergée dans un verre de Dakin dilué par de l'eau. Ces croûtes sont fréquentes s'il existait des adhérences entre prépuce et gland. Il faut que la muqueuse se refasse.

Les points se résorbent seuls après au moins 1 mois. Une fois les fils partis, le liseré rouge disparaîtra et la peau redeviendra blanche et souple.

Il est souhaitable que la verge reste au repos durant 7 jours pour éviter de perdre tous les fils.

Les suites sont parfois difficiles, il faut faire des soins locaux et patienter.